

## Châtaigniers

| Variété              | Origine   | Maturité     | Fruit  | Résistance au gel /<br>débourrement   | Grosueur du<br>fruit | Productivité                           | Vigueur          | À savoir   |
|----------------------|---|--------------|--|---|----------------------|--|------------------|--|
| BELLE EPINE          | Dordogne  | demi-tardive | acajou foncé avec parfois<br>des irrégularités de<br>coloration          | débourrement semi-tardif  | moyen à gros         | moyenne à bonne<br>(assez irrégulière) | moyenne à forte  | parfait pour la conserverie et<br>de bons résultats en confiserie,<br>convient aussi au marché de<br>frais   |
| BOUCHE DE BETIZAC    | Création de l'INRA en 1962                                | précoce      | châtain rouge clair virant<br>rapidement au brun foncé                   | débourrement précoce  | gros                 | bonne                                  | assez forte      | variété astaminée (les fleurs<br>mâles ne contiennent pas<br>d'étamines)   |
| BOURNETTE            | hybride naturel de Castanea<br>crenata et Castanea sativa | demi-précoce | châtain très clair, le fruit<br>tombe hors de la bogue                   | débourrement précoce,<br>les bourgeons principaux<br>craignent un peu le gel        | gros à très gros     | très bonne                             | moyenne          | fruit très apprécié en frais,<br>variété qui s'adapte bien au<br>climat  |
| MARAVAL              | Création de l'INRA à<br>Lalevade-d'Ardèche en 1986        | précoce      | marron-acajou brillant à<br>chair ferme                                  | débourrement précoce,<br>les bourgeons principaux<br>craignent un peu le gel        | gros                 | très bonne                             | faible à moyenne | très bonne résistance aux<br>bioagresseurs<br>fruits à consommer frais,<br>grillés ou cuits, très bon pour<br>la crème de marron,<br>possibilité de les congeler |
| MARIGOULE            | hybride naturel de Castanea<br>crenata et Castanea sativa | semi-précoce | rouge-brun brillant  | débourrement précoce à<br>très précoce, les<br>bourgeons peuvent<br>craindre le gel | gros à très gros     | moyenne                                | très bonne       | pollinisation difficile d'où la<br>nécessité d'associer des<br>pollinisateurs tels que Belle<br>Epine, Bournette ou Maraval<br>à consommer en fruit frais        |
| MARRON DOREE DE LYON |   | demi-tardive | châtain rouge brillant   | débourrement tardif   | moyen à gros         | moyenne à bonne                        | moyenne          | variété adaptée au marché<br>amateur, bonne en<br>conserverie, en confiture  |
| MARRON DE REDON      |   | demi-tardive | marron clair, peau luisante<br>et mince, très bonne qualité<br>gustative |   | gros                 |  |                  |  |
| NOUZILLARD DU LUDE   | Creuse  | demi-tardive | chair tendre   |   | petit à moyen        |  | bonne            |  |