














## Poiriers





Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
ABATE FETEL	issue d'un semis de hasard par l'abbé Fetel dans le Rhône, vers 1866	mi-septembre	fruit allongé, épiderme jaune bronzé piqueté de brun, chair blanche, juteuse, fondante et sucrée	gros	3 à 4 mois à 0°C	variété rustique et assez productive malgré la présence d'alternance
 ALEXANDRINE DOUILLARD	obtenue par M. Douillard (architecte à Nantes) en 1849	dès mi-septembre	allongé, forme irrégulière, côtelée, épiderme jaunâtre ponctué de roux, lavé de rose à l'insolation, chair blanche, fine, juteuse, sucrée et fondante, saveur beurrée	moyen	octobre	a tendance à devenir pâteuse
 ANDRE DESPORTES	obtenue par André Leroy (pépiniériste à Angers) en 1854	mi-juillet	jaune verdâtre, rouge au soleil, chair blanche, sucrée et acidulée, fondante et parfumée	moyen	2 mois	arbre très fertile, variété dédiée au fils du directeur commercial de la pépinière d'André Leroy
 ANGELYS ®	issue du croisement entre Doyenné d'Hiver et Doyenné du Comice	fin septembre - début octobre	épiderme rugueux et épais (résiste aux manipulations) bronzé sur quasiment la totalité du fruit, chair fondante et savoureuse, fine, très juteuse et équilibrée		mars	bonne productivité, bon comportement face aux maladies




Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
BERGAMOTE	obtenue par semis par le major Espéren en 1830 (Belgique)	dès décembre	peau rude, jaune verdâtre, marquée de tâches noireâtres, chair jaunâtre, fine, très fondante et juteuse, légèrement pierreuse	moyen		arbre très vigoureux
 BEURRE CLAIRGEAU	Nantes, 1838	novembre	allongé, jaune grisâtre ponctué de vert et de brun, chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, acidulée et peu pierreuse	gros		sensibilité importante à la tavelure sur feuilles et fruits, et au pseudonomas sur les feuilles, bonne résistance au transport
BEURRE D'AMANLIS	Amanlis (près de Rennes), début du XIXème siècle	septembre	épiderme jaune verdâtre, rouge-brun à l'insolation, chair blanchâtre, fine, très juteuse mais pierreuse, sucrée et parfumée	assez gros	octobre	très forte vigueur et développement rapide, sensible à la tavelure
 BEURRE LEBRUN	obtention par M. Gueniot (pépinieriste à Troyes) en 1856	fin septembre à octobre	fruit conique très allongé, épiderme fin, jaune verdâtre pointillé de fauve, chair blanche jaunâtre, fondante, juteuse et peu acidulée	assez gros		vigueur moyenne, bonne résistance à la tavelure, peut-être utilisée comme poire à cuire
 BEURRE GIFFARD	Angers, 1825	fin juillet	jaune verdâtre ponctué de brun, chair blanche, fine, fondante, peu pierreuse	moyen	2 mois	principaux pollinisateurs André Desportes, Louise Bonne d'Avranches, Beurré Clairgeau


Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir	
	BEURRE HARDY	France, 1820	fin août	jaune verdâtre recouvert de rouge bronzé, chair blanche, très fine et fondante, très juteuse et pierreuse au centre	moyen à gros	2 à 3 mois	principaux pollinisateurs : Williams, Conférence, Comice
	BEURRE SUPERFIN	semis de Duchesse d'Angoulême, de Gros-Blanquet et de Doyenné par M. Goubault (horticulteur à Angers) en 1837	septembre	bosselée, jaune d'or parsemée de tâches fauves et rougeâtre à l'insolation, chair blanchâtre, fin, fondante, juteuse et un peu granuleuse au centre	gros	octobre	arbre vigoureux, rustique
	CLAPP'S FAVORITE	M. T. Clapp à Dorchester (Massachusetts, USA) en 1860	août	épiderme vert virant au rouge et lavé de rouge à l'insolation, chair très juteuse avec un bon équilibre sucre-acidité	moyen à gros	très mauvaise conservation	forte vigueur, port de l'arbre à tendance pleureur, sensible aux attaques de pathogènes
	COMTESSE DE PARIS	M. Foureine (horticulteur) à Dreux, 1882	fin novembre	jaune verdâtre piqueté de marron, peau lisse, chair très juteuse et sucrée, saveur relevée	moyen	3 à 4 mois	pollinisateur : Louise Bonne d'Avranches




Auteur : Ulysses Prentiss Hedrick

	Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
	CONFERENCE	Angleterre	début septembre	vert jaune, chair très juteuse, sucrée, légèrement acidulée	moyen	4 à 5 mois	autofertile, principaux pollinisateurs : Comice, Williams
	COCOMERINA (poire sanguine)		septembre à octobre	fruit rond, vert, chair rouge, délicieux en compote, confiture ou au four	petit (20 à 60 g)	très courte	croissance vigoureuse
Auteur : Ulysses Prentiss Hedrick 	CUISSE MADAME		juillet	allongé, épiderme jaune lavé de carmin, moucheté de roux, chair sucrée, fondante et juteuse		octobre (2 à 3 mois)	précoce, peut être palissée, parfois astringente (doit être consommée blette)
	CURE	France, 1760	novembre	fruit allongé verdâtre	très gros	3 mois	poire à cuire



Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
	France, 1840, comice horticole du Maine et Loire	mi-septembre	jaune vert, plaques rouges à l'insolation, chair blanche, fine, fondante, juteuse, très sucrée	gros à très gros	4 à 5 mois	principaux pollinisateurs : Conférence, Williams, Dr Jules Guyot
	France, 1870	début août	vert clair devenant jaune à maturité, chair fine, juteuse, sucrée et fondante	moyen à gros	2 à 3 mois	principaux pollinisateurs : Williams, Comice, Conférence, sensible au carpocapse
	France (forêt de Rochechouart), 1850	fin octobre	jaune teinté de rouge à l'insolation	moyen	3 à 4 mois	synonyme d'épine du mas, principaux pollinisateurs : Beurré Hardy, Beurré Giffard, Beurré Clairgeau
		début octobre	jaune verdâtre pigmenté d'orange, chair blanche, très juteuse, fondante, fine, peu sucrée et légèrement acidulée	gros	jusqu'à mi-novembre	principaux pollinisateurs : Louise Bonne d'Avranches, Beurré d'Anjou
		septembre	épiderme jaune, chair sucrée	moyen		

Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir	
 <p>Auteur : INRA</p>	JEANNE D'ARC	obtention par A. Sannier en 1885 en Normandie	novembre	épiderme jaune citron clair teinté de rose à l'insolation, chair blanche, fine, juteuse, parfumée, sucrée et acidulée	gros	1 à 2 mois	variété très résistante à la tavelure
	LECTIER	obtenue par M. Auguste Lesueur (horticulteur) à Orléans à la fin du 19ème siècle	novembre	épiderme jaune doré ponctué de roux, couleur fauve autour du pédoncule, chair blanche, fine, juteuse et parfumée	gros à très gros	janvier	pépin de Williams fécondé par Bergamotte Fortuné, poire dédiée au propupreur du roi (1889), arbre vigoureux et fertile
	LOUISE BONNE D'AVRANCHES	semis de M. Longueval, Avranches, 1780	septembre	vert jaunâtre, ponctué de brun clair et teinté de rouge vif à l'insolation, chair fine, fondante, très juteuse, sucrée et sans pierre	gros		développement rapide
	GENERAL LECLERC	semis de Doyenné du Comice, moitié du 20ème siècle	octobre	épiderme jaune bronze, chair sucrée, très parfumée, excellente qualité gustative	gros		tendance à l'alternance, calibre des fruits assez irrégulier
	GIROUFLE	Pays de la Loire, Sarthe		utilisée pour la poire tapée en Sarthe, excellente pour les confitures			
	MARGUERITE MARILLAT	Mr Marillat, pépiniériste à Villeurbanne, 1874	septembre à octobre	jaune, chair blanche jaunâtre, juteuse, parfumée, sucrée et acidulée	très gros (jusqu'à 700 g)	peu résistant au transport donc conservation limitée	bonne résistance à la tavelure, faible vigueur, très fertile

Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
OLIVIER DE SERRE	1861, semis par M. Boisbunel de la Fortunée d'Angers, à Rouen	février	forme sphérique, bosselé, épiderme jaune, couvert de points et larges tâches fauve, rouge à l'insolation, mince, chair fondante, assez fine, odorante, juteuse, sucrée et parfumée	gros	très bon fruit de garde	peu fertile
<small>Auteur : Xth-Floor</small> 	croisement de Belle Angevine avec Williams Bon Chrétien, par Ch Packham en Australie, 1896	septembre	fruit bosselé, verdâtre devenant jaune à maturité, chair blanc jaunâtre, trs juteuse et sucrée, légèrement acidulée, ressemble à Williams	assez gros	novembre	vigueur moyenne, forte production régulière, nécessite un éclaircissage car les gros fruits de forment sur des rameaux longs et fins
PIERRE CORNEILLE	Arsène Sannier à Rouen, croisement entre Beurré Diel et Doyenné du Comice	octobre	jaune, chair juteuse	moyen		
POIRE DE COQ	Normandie		jaune tacheté de brun, chair douce et sucrée, mi-fondante et rarement pierreuse	gros		poire à cuire
PRECOCE DE TREVoux		août	chair ferme, assez fondante à extrême maturité, un peu acidulée, parfum rafraichissant, à consommer cru ou en conserve			très peu sensible aux maladies, croissance lente, aucune alternance
PRESIDENT HERON	semis d'un pépin de beurré d'Amanlis en 1894 à Rouen	fin août - début septembre	fruit arrondi à l'épiderme bronze et à la chair tendre, douce et sucrée	gros	3 à 4 mois	
SAINT JEAN	Claude Mollet, 1660	juin	jaune clair parsemé de points roux, devenant rose pâle à maturité, chair sucrée, peu douce, non pierreuse, poire de deuxième qualité	petit		très fertile, précoce

Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
SCHWEIZERHOSE (=culotte suisse)	Suisse, vers 1800	mi-septembre à fin octobre	rayures verticales jaunes et vertes, chair tendre	moyen	bonne	variété plutôt rare, cette variété étonnante tire son nom de sa ressemblance avec le pantalon de la garde suisse au Vatican, peu productive
 SOLDAT LABOUREUR	1820		chair très sucrée, utilisation en poire pochée	moyen		autofertile
SUCREE DE MONTLUCON	1812, Montluçon	mi-octobre	jaune teinté de roux, chair fine, fondante, sucrée et parfumée	gros	décembre	principaux pollinisateurs : Williams, Beurré Hardy, Conférence
 TRIOMPHE DE VIENNE	obtention par J. Collaud en 1864 dans l'Isère	septembre à octobre	fruit allongé, jaune vif parsemé de tâches bronze, chair blanche, fondante, juteuse, excellent goût	très gros	courte durée de conservation	sensible au feu bactérien, vigueur moyenne, principaux pollinisateurs : Conférence, Comice, Beurré Hardy
 WILLIAMS	Angleterre, 1796	mi-août	jaune d'or	moyen	3 à 4 mois	poire la plus cultivée dans le monde, très appréciée en frais, principaux pollinisateurs : Conférence, Dr Jules Guyot
WILLIAMS DUCHESS	John Williams, 1841	novembre	verdâtre, jaune d'or à l'insolation, chair fine, assez fondante, juteuse, fortement acidulée et quelque peu piquante	très gros		



Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Conservation	À savoir
 WILLIAMS ROUGE	Washington (USA), 1938 (mutant de Williams)	mi-août	rouge foncé, chair fondante, juteuse, scurée, acidulée, musquée	moyen	3 à 4 mois	principaux pollinisateurs : Conférence, Dr Jules Guyot, Beurré Hardy, Doyenné du Comice
HOMORED ® WILLIAMS ROUGE	issu d'une mutation de Williams rouge	mi-août	rouge, chair fine, fondante, aromatique et légèrement sucrée	gros		bonne productivité et peu sensible à l'alternance
ANTRICOTIN (poirier à poiré)		fin octobre	jaune et rouge à l'insolation, ponctué de roux, chair ferme, très juteuse et acide	petit à moyen	très bonne	très grande vigueur
FAUSSET (poirier à poiré)		fin octobre	jaune verdâtre lavé de rouge à l'insolation, chair ferme, grossière et très juteuse	moyen	très bonne	très forte vigueur, grande longévité
PLANT DE BLANC (poirier à poiré)		mi-octobre	lisse, jaune verdâtre ponctué de roux, présence de liège aux deux pôles, chair très juteuse et acide	petit à moyen	bonne	très forte vigueur, croissance rapide, donne en grosse quantité tous les deux ans, rustique
 POIRE DE CLOCHE (poirier à poiré)		novembre	vert-jaune, ponctuée de roux, chair ferme, grossière et acidulée	moyen à gros	très bonne	bonne vigueur, donne tous les deux ans, très rustique